核准日期：2022年02月25日 【用药须知】 对接受生长激素治疗的患者者充分告知 【儿童用药】 III 期临床试验： 最由于注射量了一般重组人生长激素注射液，在 0.1-0.4mg/kg/d 范围中

【药品上市许可持有人】 【生产企业】 【生产地址】 【注册分类】 【规格】 【包装】 【有效期】 【执行标准】 【批准文号】 【药品上市许可持有人】

各类神经系统疾病	头晕、头痛	良性颅内压升高
胃肠反应	腹部不适、腹痛恶心呕吐	
肌肉骨骼系统疾病	关节痛	肌痛

严格按照要求注射和保存。

注射前：

请使用与本品匹配的[illegible]注射器（型号：DZ-[illegible]）进行注射。

使用及保存，请严格按照电子笔式注射器的说明书进行操作。

断的剂量受限及糖尿病可能会在本品治疗期间出现。患者在生长激素治疗期间，应定期监测血糖水平，尤其是具有糖尿病风险因素的患者。

【药物相互作用】

糖皮质激素会抑制本品的促生长作用，因此接受生长激素和糖皮质激素治疗的患者需要更频繁地调整生长激素剂量，以维持治疗效果。

【儿童生长激素缺乏症（GHD）患者】

【儿童生长激素缺乏症（GHD）患者】

【儿童生长激素缺乏症（GHD）患者】