GenSci
金赛药业

核准日期：2024年[illegible]月[illegible]日

金赛欣®

黄体酮注射液(II)说明书

请仔细阅读说明书并按照医师指示使用

【药品名称】

通用名称：黄体酮注射液(II)

英文名称：Progesterone Injection (II)

汉语拼音：Huangtiantong Zhusheyye (II)

【成份】

本品主要成份为黄体酮

化学名称：孕甾-4-烯-3，20-二酮

化学结构式：



分子式：$C_{21}H_{30}O_2$

分子量：314.47

辅料：羟丙基倍他环糊精、注射用水

pH值：6.0~8.0

渗透压摩尔浓度：270~330mOsmol/kg

【性状】

本品为无色的澄明液体。

【适应症】

用于辅助生殖技术(ART)中黄体酮的补充治疗，适用于不能使用或不能耐受阴道制剂的女性。

【规格】

1.112ml : 25mg

【用法用量】

皮下或肌肉注射。从取卵当天开始每日注射一次25毫克，通常持续到妊娠12周。

本品由患者本人在接受培训后可以进行皮下注射或前往医院进行肌肉注射。

【不良反应】

下表展示了在临床试验期间接受黄体酮注射液报告的主要不良反应。数据以系统器官分类(SOC)和频率表示。

SOC	非常常见	常见	偶见
精神病类	/	/	精神紊乱
各类神经系统疾病	/	头痛	头晕
胃肠系统疾病	/	腹胀、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、消化不良、便秘、口干、肠胃不适、胃肠胀气、胃肠炎、胃食管反流病、痔疮、口腔溃疡、口腔念珠菌病、口腔疼痛、口腔出血、口腔不适、口腔感觉异常、口腔麻木、口腔水肿、口腔干燥、口腔刺激、口腔红斑、口腔白斑、口腔黏膜病变、口腔黏膜炎、口腔黏膜出血、口腔黏膜水肿、口腔黏膜红斑、口腔黏膜白斑、口腔黏膜刺激、口腔黏膜干燥、口腔黏膜不适、口腔黏膜感觉异常、口腔黏膜麻木、口腔黏膜疼痛、口腔黏膜溃疡